

# Eine eigentümliche Modalität — Calcarea phosphorica

Von A. Wegener

## Zusammenfassung

Ein Patient mit einer beidseitigen Epikondylitis konnte mit *Calcarea phosphorica* geheilt werden. Zur Mittelwahl führte die unerklärliche Ausbreitung der Beschwerden von der linken auf die rechte Seite.

## Stichwörter

Epikondylitis — *Calcarea phosphorica* — Modalität.

## Summary

A patient with epicondylitis on both sides could be cured with *Calcarea phosphorica*. The leading symptom was the inexplicable modality: extending of the ailments from left to right.

## Keywords

Epicondylitis — *Calcarea phosphorica* — modality.

Im August 1994 suchte mich ein 47jähriger Patient auf, der seit 4 Monaten an einer beidseitigen Epikondylitis litt. Die Beschwerden begannen nach einer Verletzung des linken Armes, die aber vergleichsweise so harmlos war — er schlug den Arm an einer Kante an —, daß ein ursächlicher Zusammenhang fraglich bleibt. Jetzt ist die Bewegung im Ellbogengelenk nur unter stechenden-krampfenden Schmerzen möglich. Kälte empfindet er unangenehm, lokale Wärmeanwendungen lindern die Schmerzen etwas. Merkwürdig war, daß sich die gleichen Beschwerden nach einer kurzen Zeit auch am rechten Ellbogen einstellten. Orthopädische Behandlungen und eine Akupunkturtherapie brachten bis jetzt nur eine geringfügige Besserung. Da der Patient als Getränkefahrer arbeitet, ist seine berufliche Existenz durch die lange Krankschreibung gefährdet. Außer einer leichten Schwellung der Finger nach der Arbeit war

sonst nichts Nennenswertes mehr zu erfahren.

## Repertorisation

Die Aufmerksamkeit bei der Bewertung seiner für eine Epikondylitis eher typischen Symptome muß sich ganz auf die unerklärliche Verlagerung der Schmerzen von der linken auf die rechte Seite konzentrieren. Glücklicherweise findet sich im Repertorium dafür eine Rubrik: *Extremities, Pain, stitching, Elbow, left then right* (K 1140): *Calc-p.*

## Materia-medica-Vergleich

"Through elbows shooting, usually first left, then right." (GS III, 236)

"Dull pain in arms, first left, then right, from shoulder to fingers; from clavicle down to wrist; worse from change of weather." (GS III, 236)

## Mittelgabe und Verlauf

Der Patient erhielt in Einerschritten ansteigend *Calcarea phosphorica* Q 6- Q 8 (Fa. Zinsser), 5 Tropfen täg-

lich. Schon nach 2 Wochen konnte er seine Kaffeetasse wieder heben, und nach weiteren 5 Wochen waren keinerlei Beschwerden mehr vorhanden. Er konnte jetzt seiner anstrengenden körperlichen Arbeit wieder uneingeschränkt nachgehen.

### Literatur

*Hering, C.:* The Guiding Symptoms of our Materia Medica. Repr., New Delhi 1982.

*Kent, J. T.:* Repertory of the Homoeopathic Materia Medica. Repr., New Delhi 1983.

Dr. med. *Andreas Wegener*, Säntisstr. 6,  
D-78464 Konstanz